

# စအိုမှဆေးတောင့်ထည့်ခြင်း

1


မိမိပေးလိုသောဆေးနှင့်ဆေးပမာဏကို  
သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ဥပမာ

Acetaminophen Suppositories  
USP, 650 mg

Bisacodyl Suppositories 10mg


2

လက်ကိုဆေးပြီး ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ ပြီးလျှင်  
လက်အိတ်ဝတ်ပါ။




3

ဆေးတောင့်ကိုထုတ်ပြီး ချောဆီသုတ်ပါ။




4

လူနာကို ဘေးတဘက်သို့စောင်းထားပြီး  
ဒူးနှစ်ဖက်ကို ဗိုက်ဆီသို့ကွေးထားပါ။ လူနာ  
၏နောက်ကျောဘက်တွင်ရပ်ပြီး စအိုဝကိုမြင်ရန်  
တင်ပါးနှစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။



5

သင်၏လက်ညှိုးကို အသုံးပြုပြီး ဆေးတောင့်၏ချွန်သော  
ဘက်မှ စအိုထဲထည့်ပြီး စအို၏နံရံတစ်ဖက်သို့ကပ်၍  
ဝင်နိုင်သလောက် ညှင်သာစွာထည့်ပါ။



6

ဆေးပေးပြီးလျှင် လက်အိတ်ချွတ်ပြီး  
လက်ကိုသေချာဆေးပါ။



အချက်အလက် အပူပြန့်အစုံ သိလိုလျှင်  
ဤနေရာ တွင် စကန် ဖတ်ပါ

စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၁